Die Treatmentzonengröße nach der Orthokeratologie-Anpassung

Jessica Gruhl

- Ich versichere, dass in Bezug auf den Inhalt des folgenden Vortrags keine materiellen oder immateriellen Interessenskonflikte bezüglich der genannten Methoden und Geräte bestehen.

Ich versichere, die Darstellung meiner Beiträge
produkt- und firmenneutral zu halten.

- Avermann Contactlinsen, Dortmund
 - Speziallinsen-Anpassungen
 - Myopiekontrolle
- M. Sc. Vision Science and Business (Optometry)
- Fellow British Contact Lens Association (BCLA)

- Masterthesis:

Einflussfaktoren auf die Größe der topographischen Wirkungszone nach Orthokeratologie

Contact Lens and Anterior Eye 46 (2023) 101848

Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Contact Lens and Anterior Eye

journal homepage: www.elsevier.com/locate/clae

Factors influencing treatment zone size in orthokeratology

Jessica Gruhl^{a,b,*}, Frank Widmer^c, Anna Nagl^a, Stefan Bandlitz^{d,e}

^a Hochschule Aalen, Aalen University, Aalen, Germany
^b Avermann Contactlinsen, Dortmund, Germany
^c HECHT Contactlinsen GmbH, Au, Germany
^d Höhere Fachschule für Augenoptik Köln, Cologne School of Optometry, Cologne, Germany
^e College of Health and Life Sciences, Aston University, Birmingham, UK

Dipl.-Ing. (FH) Frank Widmer

HECHT Contactlinsen GmbH, Au, Deutschland

Dr. Stefan Bandlitz

Höhere Fachschule für Augenoptik und Optometrie Köln, Köln, Deutschland
College of Health & Life Sciences, Aston University, Birmingham, UK

Prof. Dr. Anna Nagl

Hochschule Aalen, Aalen, Deutschland

Graphik zur Verfügung gestellt von HECHT Contactlinsen GmbH

Refraktion

- Treatmentzone wird kleiner bei höheren Myopiekorrekturen

S.J. Vincent, P. Cho, K.Y. Chan, D. Fadel, N. Ghorbani-Mojarrad, J.M. González-Méijome, L. Johnson, P. Kang, L. Michaud, P. Simard, L. Jones, CLEAR - Orthokeratology, Cont. Lens Anterior Eye 44 (2021) 240–269.

$$TZD = \sqrt{\frac{2,7 * \text{central epithelial thinning } (\mu\text{m})}{\text{Target refractive change } (D)}}$$

Kontaktlinsenparameter

- Vergleich von $\varnothing$ 5.00 and 6.00 mm

Jung, M. Liu, Comparing 5mm and 6mm Back Optic Zone Diameter (BOZD) in Orthokeratology Lens Design, Global Specialty Lens Symposium, Las Vegas, 2022.

	$\varnothing$ 5.00	$\varnothing$ 6.00
TZ Größe (mm)	3.05 ± 0.11	3.44 ± 0.13

Topographie- und Fluoreszein-Aufnahmen nach der Anpassung von $\varnothing$ 5 mm (Bild a und c) und $\varnothing$ 6 mm (Bild b und d) (Quelle: Jung et al., GSLS 2022).

Myopiekontrolle

- Die zusammengeführten Daten von drei prospektiven Studien zeigen:
 - **0.24 mm Reduktion der AXL in 2 Jahren**
- Wirkung unabhängig vom Alter, Geschlecht, SE, Ethnizität

J. Santodomingo-Rubido, The efficacy of orthokeratology contact lens wear in reducing the axial elongation of the eye in children, BCLA, Manchester, 2023.

Clinical Trials

Retardation of Myopia in Orthokeratology (ROMIO) Study: A 2-Year Randomized Clinical Trial

Pauline Cho and Sin-Wan Cheung

ORIGINAL ARTICLE

J Optom 2009;2:215-222

Myopia Control with Orthokeratology Contact Lenses in Spain (MCOS): Study Design and General Baseline Characteristics

Jacinto Santodomingo-Rubido¹, César Villa-Collar², Bernard Gilmartin³ and Ramón Gutiérrez-Ortega²

Cornea

Myopia Control Using Toric Orthokeratology (TO-SEE Study)

Connie Chen, Sin Wan Cheung, and Pauline Cho

The Hong Kong Polytechnic University, School of Optometry, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong, China

Myopiekontrolle

- Stärkere Hemmung der AXL-Progression wenn der Ring peripherer Versteilung innerhalb des Pupillendurchmessers liegt

J. Pauné, S. Fonts, L. Rodríguez, A. Queirós, The Role of Back Optic Zone Diameter in Myopia Control with Orthokeratology Lenses, J. Clin. Med. 10 (2021).

Myopiekontrolle

- TZ-Durchmesser korreliert positiv mit AXL-Zunahme

Guo B, Cheung SW, Kojima R, Cho P. Variation of Orthokeratology Lens Treatment Zone (VOLTZ) Study: A 2-year Randomised clinical trial. *Ophthalmic Physiol Opt.* 2023;00:1–13.

0.20 mm weniger AXL-Zunahme in 2 Jahren

Statistische Power 83%

Visuelle Wahrnehmung

- Verkleinerung der TZ-Größe verstärkt sphärische Aberration

G. Carracedo, T.M. Espinosa-Vidal, I. Martínez-Alberquilla, L. Batres, The Topographical Effect of Optical Zone Diameter in Orthokeratology Contact Lenses in High Myopes, J. Ophthalmol. 2019 (2019) 1082472.

- Gleiche visuelle Performance, aber subjektiv empfundene Sehqualität besser mit größerem Ø

C. Arroyo-del-Arroyo et al., Evaluation of signs and symptoms with orthokeratology lenses having two different treatment zone sizes, BCLA, Manchester 2023.

Studie

- Zielstellung
- Material und Methode
- Ergebnisse
- Schlussfolgerungen

Zielstellung

Ausgangsparameter	
Okulär	Kontaktlinse
<ul style="list-style-type: none">• Zu korrigierende Myopie (D)• Horizontaler HH-Durchmesser (mm)• Flacher und steiler r_0 (mm)• Hornhautastigmatismus (D)• nE des flachen und steile HH-Meridians (mm)• sagH des flachen und steilen HH-Meridians (mm)	<ul style="list-style-type: none">• Radius der BC, RC, AC(mm)• Torizität der RC und AC (mm)• nE der AC (mm)• $\varnothing O$ (mm) und sein Flächeninhalt (mm²)• $\varnothing T$ (mm) und sein Flächeninhalt (mm²)

Material und Methode

- 106 Kunden des Kontaktlinseninstitutes Avermann Contactlinsen (Dortmund, Deutschland)
- 73 weiblich und 33 männlich
- 22.16 ± 8.96 Jahre
- -2.93 ± 1.39 D (Spannweite -0.50 bis -6.25 D) (SE)
- Ø 5.5, 6.0 und 6.6

Vermessung der Treatmentzone (TZ)

Vermessung der Treatmentzone (TZ)

Vermessung der Treatmentzone (TZ)

Vermessung der Treatmentzone (TZ)

Vermessung der peripheren Pluszone (PPZ)

Vermessung der peripheren Pluszone (PPZ)

Vermessung der peripheren Pluszone (PPZ)

Vermessung der peripheren Pluszone (PPZ)

Einfluss von Refraktion und Topographie

Paare statistisch signifikanter Korrelationen (n=80)		r*	p
Sphäre (D)	ØTZ kurze Achse (mm)	-0.221	0.048
Steiler HH-Radius (mm)	ØTZ vertikal (mm)	-0.244	0.029
	ØTZ lange Achse (mm)	-0.254	0.023
	TZ Fläche (mm ²)	-0.228	0.042
Hornhautastigmatismus (D)	Breite PPZ (mm)	0.266	0.017
nE Hornhautradius _(steil) (mm)	Breite PPZ (mm)	-0.222	0.047

*Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman

Einfluss des $\emptyset 0$

Topographische Zone	$\emptyset 5.5$ A = 23.76 mm ² n = 15	$\emptyset 6.0$ A = 28.27 mm ² n = 80	$\emptyset 6.6$ A = 34.21 mm ² n = 11
$\emptyset$ TZ horizontal (mm)	3.13 ± 0.27	3.33 ± 0.24	3.62 ± 0.35
$\emptyset$ TZ vertikal (mm)	3.03 ± 0.27	3.29 ± 0.29	3.58 ± 0.27
$\emptyset$ TZ lange Achse (mm)	3.25 ± 0.24	3.50 ± 0.21	3.75 ± 0.30
$\emptyset$ TZ kurze Achse (mm)	2.93 ± 0.29	3.15 ± 0.23	3.52 ± 0.29
Flächeninhalt TZ (mm ²)	7.52 ± 1.21	8.70 ± 1.05	10.40 ± 1.52
$\emptyset$ PPZ horizontal (mm)	4.77 ± 0.21	5.01 ± 0.30	5.50 ± 0.39
$\emptyset$ PPZ vertikal (mm)	4.68 ± 0.31	4.92 ± 0.37	5.44 ± 0.31
Breite PPZ (mm)	1.45 ± 0.13	1.50 ± 0.17	1.59 ± 0.18
$\emptyset$ PPZ gesamt (mm)	6.04 ± 0.28	6.32 ± 0.39	6.90 ± 0.46

Einfluss des $\emptyset$

Vorhersagemodell für die Treatmentzonen-Fläche

$$A_{TZ} = 8.374 + 0.301 \times A_{\emptyset 0} - 7.141 \times r_{OH(steil)} + 6.068 \times r_{2KL(steil)} + 2.024 \times Tor.r_{2KL}$$

Eingeschlossene Variablen

A $\emptyset 0$ (mm²)

Steiler Hornhautradius (mm)

Steiler AC Radius (mm)

AC Torizität (mm)

Schlussfolgerungen

- Vergrößernde Effekte auf die TZ zeigten sich durch höhere Myopie, steilere Radien im steilen Hornhautmeridian und größere $\emptyset$
- $\emptyset$ der OK-Linse hat den stärksten Einfluss auf die TZ-Größe
- Die Beschreibung der TZ anhand des Flächeninhaltes einer Ellipse liefert möglicherweise eine genauere Abbildung ihrer Größe

??? Fragen ???

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!