Auswahl der ersten Messlinse und deren Folge(n).

Julia Lesinski - Kontaktlinsen Warendorf GmbH
Niklas Ihrke-Bronk- Contactlinseninstitut Bronk

- Zentralradius $r_{0=r_{\text{flach}}}$ der ersten Probelinse
- gleichmäßige Druckverteilung $\varepsilon_{cl} = \varepsilon_{hh}$
- Berücksichtigung des alleinigen HH-Durchmessers
 $\varnothing T = (d_{HH-hor.} - 1,5 \dots 2,0 \text{ mm})$

Tiefsitz: Tritt eher bei Pluslinsen auf

- Material mit höherem Brechungsindex und geringem spezifischen Gewicht
- Durchmesser vergrößern (mind. 0,4mm)
- Minustragrand

seitliche Dezentration

- Habe ich dir richtige Geometrie gewählt?
- Ursache: unterschiedliche Exentritäten nasal und temporal
- Durchmesser verkleinern, bei hoher Differenz
- Durchmesser vergrößern bei geringer Differenz

Hochsitz: tritt eher bei Minuslinsen auf

- Habe ich dir richtige Geometrie gewählt?
- Durchmesser vergrößern, bei geringer Radien-Differenz
- Durchmesser verkleinern bei höherer Radien-Differenz

Nachkontrolltermin

- Tragezeit mind. 3-4 Stunden
- Nach 2- 6 Wochen
- Anamnese: Kundenempfinden während des Probetragens
- Überrefraktion
- Sitzbeurteilung zentrisch und mit Lidbeteiligung

Wenn Kunde und Anpasser zufrieden sind
= Bestellung der endgültigen Kontaktlinsen